Study or Subgroup	Hedge's g	SE	Weight	Hedge's g IV, Random, 95% CI
1.5.1 Individual MI				
D'Amico 2008	0.2	0.35	1.5%	0.20 [-0.49, 0.89]
Spirito 2004	0.27	0.14	9.2%	0.27 [-0.00, 0.54]
Walton 2010	0.03	0.23	3.4%	0.03 [-0.42, 0.48]
Subtotal (95% CI)			**14.0%**	**0.20 [-0.02, 0.43]**
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 0.79, df = 2 (P = 0.67); I² = 0%				
Test for overall effect: Z = 1.81 (P = 0.07)				
1.5.2 Group MI				
Bailey 2004	0.11	0.05	71.9%	0.11 [0.01, 0.21]
Subtotal (95% CI)			**71.9%**	**0.11 [0.01, 0.21]**
Heterogeneity: Not applicable				
Test for overall effect: Z = 2.20 (P = 0.03)				
1.5.3 Single Individual MI session				
Spirito 2004	0.27	0.14	9.2%	0.27 [-0.00, 0.54]
Walton 2010	0.03	0.23	3.4%	0.03 [-0.42, 0.48]
Subtotal (95% CI)			**12.6%**	**0.21 [-0.03, 0.44]**
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 0.79, df = 1 (P = 0.37); I² = 0%				
Test for overall effect: Z = 1.72 (P = 0.09)				
1.5.4 More than 1 MI session				
D'Amico 2008	0.2	0.35	1.5%	0.20 [-0.49, 0.89]
Subtotal (95% CI)			**1.5%**	**0.20 [-0.49, 0.89]**
Heterogeneity: Not applicable				
Test for overall effect: Z = 0.57 (P = 0.57)				
Total (95% CI)			**100.0%**	**0.14 [0.05, 0.22]**
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 2.59, df = 6 (P = 0.86); I² = 0%				
Test for overall effect: Z = 3.22 (P = 0.001)				
Test for subgroup differences: Chi² = 1.00, df = 3 (P = 0.80), I² = 0%